

Bewährte Mittel bei Abort

ACON Ⓞ, *Alet, APIS, Arn, Asar*, **BELL** Ⓞ, *Bry, Calc, Canth, Carb-v, Caul*, **CHAM**, *China, Cimic, Coloc, Croc*, **ERIG**, *Ferr*, **GELS** Ⓞ, *Helon, Hyos*, **IGN** Ⓞ, **IP**, **KALI-C** Ⓞ, *Kreos*, **LYC** Ⓞ, *Merc, Mill*, **NUX-M**, **NUX-V** Ⓞ, *Op, Phos, Plat, Plb*, **PULS** Ⓞ, *Pyrog, Rhus-t*, **SABIN** Ⓞ, **SEC**, **SEP** Ⓞ, *Sil, Sulph, Tril-p, Ust, Vib*

Ⓞ = Groma Praxistipp

ACONITUM NAPELLUS Ⓞ

- ▶ **hellrote Blutung**
- ▶ Fluor
- ▶ **trockene Schleimhäute**, vaginale Untersuchung ist dadurch schmerzhaft

Causa ▶ **Angst**, Schreck, **Schock**, Emotionen, Ärger, sexueller Missbrauch, Fieber, Kälte, Zystitis

Gemüt ▶ **plötzliche Panik**, dauernde **Angst**, etwas Schreckliches könnte ihr zustossen, nach schlechtem Arztbericht, spürt Fötusbewegung nicht mehr, Panik bricht aus

▶ **Panik das Kind zu verlieren**

▶ **Angst zu sterben, vor Alleinsein**, sich zu bewegen, zu stürzen, gegen Personen oder Gegenstände zu stossen

▶ grosse **Unruhe**, hochgradige Erregung

Begleitsymptome ▶ Schwindel beim Aufstehen, muss sich wieder hinlegen, fürchtet sich zu bewegen

▶ Fieber plötzlich hoch mit starker Unruhe

▶ Atmung ist beschleunigt

▶ Herzklopfen, -rasen

▶ grosser Durst auf kalte Getränke

Modalitäten < **Alleinsein**, Wärme, warmes Zimmer, Lärm, Musik, nachts

> Gesellschaft, Zuspruch, Kälte, kalte Umschläge, kalte Getränke, frische Luft

Aletris farinosa

- ▶ habituellem Abort, schlaffes Gewebe,

Uterusprolaps oder -verlagerung etc.

- ▶ **Atonie des Uterus**
- ▶ Zervixinsuffizienz, fehlende Muskelkraft, das Gewicht des wachsenden Fötus zu tragen
- ▶ reichliche, **passive Blutung, schwarzes Blut und Koagula/Klumpen**
- ▶ Fluor
- ▶ Völle- und **Schwere-** oder **Gewichtsgefühl** in der Uterusregion

Causa ▶ **Anämie, Schwäche, Uterusschwäche**, Kraftlosigkeit durch lange Krankheit, mangelhafte Ernährung, Säfteverlust (Schwitzen, Erbrechen, Durchfall, Blutungen)

Gemüt ▶ Reizbarkeit

Begleitsymptome ▶ Müdigkeit

▶ Schwindel

▶ Übelkeit

Apis mellifica

- ▶ habituellem Abort
- ▶ reichliche Blutung während und nach Abort
- ▶ scharfe, **stechende, brennende Schmerzen**, v.a. im **rechten Ovargebiet**, mit wehenartigen Schmerzen in der Uterusregion, erstrecken sich zum Oberschenkel
- ▶ Abort im 1. und 2. Schwangerschaftsdrittel (0–28. SSW)

Causa ▶ Eifersucht, Wut, Verdross, Bienenstich, instrumentelle Untersuchung, unterdrückte oder ungenügend entwickelte Ausschläge

Gemüt ▶ nervöse Ruhelosigkeit, Geschäftigkeit, ungeschickt, lässt alles fallen, eifersüchtig, weinerlich, hysterisch