
 Übliche Kontrollen und Therapien




- ▶ Tokolyse (Wehenhemmung) mit β_2 -Sympathomimetika:
 - intravenös oder peroral (Nebenwirkungen: Tachykardie bei Mutter und Kind)
- ▶ evtl. Forcieren der Lungenreifung beim Kind:
 - wenn keine Infektionen vorhanden sind

Frühgeburt

- ▶ Können trotz allen Massnahmen die Frühgeburtsbestrebungen nicht aufgehalten werden, kommt es zur Frühgeburt.
 - ▶ Das Management einer Geburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche ist von sehr vielen Faktoren abhängig und wird individuell geleitet. Die Geburt kann sowohl spontan vaginal erfolgen, als auch per Kaiserschnitt (Sectio).
-

→ **Hinweis für HomöopathInnen:** In den Repertorien ist die Frühgeburt in der Unterrubrik «Abort» zu finden.

Bewährte Mittel bei Frühgeburt, drohender Frühgeburt

Arn, Asar, Canth, *Caul*, Cimic, Ferr, *Gels*, Lac-c, **NUX-V** , Op, Plb, **PULS**, Ruta, **SABIN** , *Sec*, **SEP** 

 = Groma Praxistipp

Arnica montana

- ▶ **hellrote** Blutung mit **dunklen Klumpen**
- ▶ starke **Berührungsempfindlichkeit**, lässt sich nicht berühren, erträgt Untersuchung nicht
- ▶ **Wund-** und **Zerschlagenheitsgefühl** des Uterus oder der Beckenregion, in der Schambeinfuge oder im Iliosakralgelenk und des ganzen Körpers
- ▶ **wehenartige Schmerzen**, Schmerzen in Bauchmuskeln, kann nicht aufrecht gehen
- ▶ Schmerzen im Uterus nach Überanstrengung

Causa ▶ **Verletzung, Unfall**, Sturz, Erschütterung, Überanstrengung, Schock

Gemüt ▶ lehnt Hilfe ab, sagt, ihr fehle nichts
 ▶ **Unruhe, ständiger Lagewechsel**, findet keine bequeme Stelle im Bett

Begleitsymptome ▶ Gefühl das Bett ist zu hart
 ▶ unwillkürlicher Stuhl- und Urinabgang

Modalitäten

- < Berührung, Bewegung, Druck, Kälte
- > Ruhe, Wärme, warme Umschläge

Asarum europaeum

- ▶ drohende Frühgeburt im 8. Monat
- ▶ bei übernervösen und empfindlichen Frauen
- ▶ dunkle, schwarze Blutung

Causa ▶ nervöse Überempfindlichkeit

Gemüt ▶ nervös, grosse Ruhelosigkeit der Hände, hysterisch

- ▶ **Überempfindlichkeit der Nerven, überempfindlich auf Geräusche** (Papierrascheln, Kratzen, Kratzen auf Seide, Knistern, knirschende Geräusche sind am schlimmsten, laute Geräusche)

Begleitsymptome ▶ grosser Mangel an Lebenswärme, friert