

Lokalisation der Plazenta	Blutungsverlauf	Therapie
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sectio: <ul style="list-style-type: none"> – Das Vorliegen der Plazenta über dem Muttermund verunmöglicht eine normale vaginale Geburt, da der Ausgang durch die Plazenta versperrt ist. Die Geburt per Sectio ist unumgänglich.

Bewährte Mittel bei Plazenta praevia

Erig, Ip, NUX-V Ⓞ, *SABIN* Ⓞ, *SEP* Ⓞ, *Verat*

Ⓞ = Groma Praxistipp

Erigeron canadense

- ▶ **hellrote, gussartige**, flüssige Blutung, **verstärkt** durch jede **Bewegung**, kann bis zu einem gewissen Grad durch absolute Ruhe (konsequente Bettruhe) kontrolliert werden

- Begleitsymptome*
- ▶ **Blasenreizung** (Dysurie, Brennen in der Blase etc.)
 - ▶ **Darmreizung** (Blähungen, Durchfall, Dysenterie, Brennen)
 - ▶ Hämorrhoiden hellrot blutend

- Modalitäten*
- < **geringste Bewegung**, Anstrengung
 - > konsequente **Ruhe**/Bettruhe

Ipecacuanha

- ▶ **hellrote, reichliche**, gussartige, anhaltende Blutung
- ▶ **Schmerzen** oder Kneifen um **Nabel**, Schmerz **schiesst** zum **Uterus**

- Gemüt*
- ▶ unzufrieden, kaum zufriedenzustellen, weist das Verlangte zurück, weiss nicht, was sie will

- Begleitsymptome*
- ▶ quälende **Übelkeit**, selbst Erbrechen erleichtert nicht

- ▶ Brechreiz, Würgen, **Erbrechen**, empfindlich auf Speisegeruch
 - ▶ Zusammenschnüren der Brust mit **Atemnot**, plötzliches Keuchen, Erstickungsgefühl
 - ▶ **Erschöpfung**, blass, sieht krank aus, Ohnmachtstendenz
 - ▶ **Speichelfluss**
 - ▶ Durstlosigkeit
- Modalitäten*
- < Bewegung

NUX VOMICA Ⓞ

- ▶ krampfartige Schmerzen
- ▶ **Harn-** oder **Stuhldrang** bei jeder Uteruskontraktion
- ▶ ständiger **Stuhldrang** und Gefühl, der Darm sei zu wenig entleert

- Gemüt*
- ▶ **reizbar** bis jähzornig, aggressiv, erträgt keinen Widerspruch, voller Wut und Ärger
 - ▶ nervlich überlastet, arbeitet zu viel, keine Zeit für Schwangerschaft, gönnt sich keine Ruhe, kann sich nicht entspannen
 - ▶ unzufrieden, **ungeduldig**
 - ▶ **Überempfindlichkeit** auf Licht,