

## Bewährte Mittel bei Totgeburt

*Acon*, *Canth*, *Gels*, **IGN** Ⓞ, **PULS** Ⓞ, *Ruta*, **SAB** Ⓞ, *Sec*

Ⓞ = Groma Praxistipp

### *Aconitum napellus*

▶ Wirkung v.a. auf der Gemütssebene

<i>Gemüt</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schock nach Bekanntgabe der Diagnose</li> <li>▶ <b>plötzliche Panik, Angst</b></li> <li>▶ <b>Angst zu sterben, vor Alleinsein</b></li> <li>▶ grosse <b>Unruhe, hochgradige Erregung</b></li> </ul>
<i>Begleitsymptome</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ trockene Schleimhäute, vaginale Untersuchung dadurch schmerzhaft</li> <li>▶ Schwindel beim Aufstehen, muss sich wieder hinlegen, fürchtet sich zu bewegen</li> <li>▶ Fieber plötzlich hoch mit starker Unruhe</li> <li>▶ Atmung ist beschleunigt</li> <li>▶ <b>Herzklopfen, -rasen</b></li> <li>▶ grosser Durst auf kalte Getränke</li> </ul>
<i>Modalitäten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; <b>Alleinsein</b>, Lärm, Musik</li> <li>&gt; frische Luft, Gesellschaft, Zuspruch</li> </ul>

### *Cantharis vesicatoria*

▶ **fördert die Geburt des toten Kindes**  
 ▶ **Entzündung der Genitalien**

<i>Gemüt</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stöhnen, Jammern, <b>schreit</b> vor Schmerzen, z.B. beim Wasserlösen</li> </ul>
<i>Begleitsymptome</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ starke, <b>heftige Entzündung</b>, rasche Entwicklung</li> <li>▶ akute Zystitis, plötzlich <b>unerträglicher Harndrang, brennende Schmerzen</b> vor, während und nach Miktion</li> <li>▶ geringste Menge Harn löst unwiderstehlichen Harndrang aus</li> <li>▶ <b>Urin geht tropfenweise</b> ab</li> </ul>

- ▶ **blutiger Urin**
- ▶ dumpfe Schmerzen in Nierengegend, Nephritis mit blutigem Ausfluss

<i>Modalitäten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; vor, während und nach Miktion, Kaffee, kalte Getränke</li> <li>&gt; Reiben (Unterleib), Kälte, kalte Anwendungen</li> </ul>
--------------------	---

### *Gelsemium sempervirens*

▶ Wirkung v.a. auf der Gemütssebene

<i>Gemüt</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ verschlossen, will alleine sein</li> <li>▶ teilnahmslos, apathisch</li> <li>▶ <b>Erwartungs- und Versagensangst</b></li> <li>▶ nervös, innerlich verkrampft, kann sich nicht entspannen</li> <li>▶ hysterisch</li> </ul>
<i>Begleitsymptome</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Frösteln, friert, <b>nervöses Frösteln</b></li> <li>▶ lähmende <b>Schwäche</b>, Erschöpfung</li> <li>▶ <b>Zittern, zittrige Knie</b>, Koordinationsstörung, Kontrolle über Bewegung verloren, Beine kraftlos, Schweregefühl durch geringste Anstrengung</li> <li>▶ häufiger Harndrang</li> <li>▶ Durchfall</li> <li>▶ Kreislaufbeschwerden, Schwindel, Hypotonie</li> <li>▶ <b>Kopfschmerzen</b> vom Nacken zur Stirn und zu den Augen, Schweregefühl der Lider, Ptosis</li> <li>▶ Sehstörungen, Doppeltsehen</li> </ul>
<i>Modalitäten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; <b>Aufregung</b>, Anspannung, schlechte Nachrichten, Denken an Beschwerden</li> <li>&gt; Ruhe, Alleinsein, Wasserlösen, Schwitzen</li> </ul>